



Gastroskopi

Hvad er en gastroskopi?

Gastroskopi er en kikkertundersøgelse, hvor man undersøger spiserør, mavesæk og tolvfingertarm med et lille videokamera monteret på en bøjelig sonde. Gastroskopet indføres igennem mund eller næsebor og derefter via spiserøret ned til mavesækken og tolvfingertarmen.

Hvorfor laver man en gastroskopi?

Formålet med kikkertundersøgelsen er at undersøge for blandt andet inflammation, betændelse, sår og svulster (godartede og ondartede). Man kan desuden tage vævsprøver fra forandringer og til undersøgelse for mavesårsbakterier.

Hvordan forbereder jeg mig til en gastroskopi?

Du skal være **fastende** til undersøgelsen. Du må **ikke spise eller ryge 6 timer** før undersøgelsen. Du må drikke klare væsker **indtil 2 timer** før undersøgelsen. Du må ikke drikke mælk, juice med frugtkød eller andre væsker som man ikke kan se igennem.

Sørg for at have arrangeret hjemtransport hvis du ønsker at kunne modtage beroligende medicin. Da man ifølge færdselsloven ikke må føre motoriseret køretøj eller cykle i 24 timer efter, man fået beroligende medicin. Man kan være påvirket af medicinen i op til 24 timer efter.

Hovedbudskab

- Kikkertundersøgelse af den øvre mavetarmkanal.
- Undersøgelse varer 5-10 minutter.
- Undersøgelsen kan være forbundet med ubehag.

Vejledning

Din undersøgelse er planlagt til:

Den ____ / ____ kl ____ : ____

Du skal være fastende til undersøgelsen.

Arrangere hjemtransport

Gastroskopi

Hvordan foregår en gastroskopi?

Undersøgelsen foregår på et leje på undersøgelsesstuen. Undersøgelsen i sig selv kan vare 5-10 minutter. Samlet set skal du regne med 20-25 minutter for hele konsultationen. I forbindelse med undersøgelsen kan man blive tilbudt noget lokalt bedøvende i svælg eller næsebor samt eventuelt beroligende medicin igennem et lille kateter, som vil blive anlagt i en blodåre (vene) i albuebøjning eller på bagsiden af hånden. Under undersøgelsen puster man luft ind i mavesækken ved hjælp af gastroskopet.

Hvad sker der bagefter?

Hvis du har fået svælgbedøvelse, må du ikke spise og drikke i 2 timer efter undersøgelsen på grund af risiko for fejlsynkning.

Du vil få svar på vævsprøver fra klinikken i løbet af 2-3 uger, medmindre andet er aftalt.

Hvilke risici er forbundet med gastroskopi?

Der kan hyppigt opleves forbigående irritation eller ømhed af næse, svælg og/eller hals. Endvidere er det hyppigt at opleve let ubehag og trykken i maven samt bøvsen og oppustethed. Blodigt opspyt kan forekomme. Komplikationer til den beroligende medicin er en sjælden bivirkning. Yderst sjældent kan der gå hul på mavetarmkanalen eller opstå tandskader.

Ved mistanke om komplikationer som for eksempel stærke mavesmerter, blødning eller feber skal man straks tage kontakt til klinikken. Uden for klinikkens åbningstid skal man opsøge læge, 1813 eller 112 afhængig af sværhedsgraden af symptomerne.



Se illustrationer og info om gastroskopi på sundhed.dk eller via denne QR kode.