

Afføringsprøve – Helicobacter Pylori

Formål med undersøgelsen?

Formålet med undersøgelsen er at undersøge, om der er mavesårsbakterier (*helicobacter pylori*) i mavesækken.

Hvordan forbereder jeg mig?

- Du kan spise, som du plejer.
- Prøven skal tidligst tages 4 uger efter endt behandling med antibiotika.
- Prøven kan tages tidligst 2 uger efter endt behandling med syrehæmmende medicin.
- Er du ikke i behandling med noget af ovenstående, så kan du tage prøven med det samme.

Hvordan foregår undersøgelsen?

Fra klinikken udleveres alt du skal bruge:

- Pose med to stk. plastikrør – et rør til prøvemateriale og et til transport
- Følgeseddel
- opsamlings sæt
- En foret og frankeret konvolut

Fremgangsmåde:

1. Opsamlings ”dugen” placeres på toilettet (følge venligst vejledning). Det er vigtigt at prøven ikke blandes med urin.
2. Fra dugen skovles afføring op i glasset. Vandtynd afføring, blod og slim skal også medtages. Der skal bruges 10 ml.
3. Forsøg at undgå at der kommer afføring uden på glasset.
4. Sæt strekcode på glasset fra følgesedlen.
5. Skru låget godt til og placer glasset i transportrøret.
6. Send afføringsprøven snarest (skal afleveres på posthus eller hos egen læge, ikke i postkasse).
7. Hvis den ikke kan sendes samme dag, da skal den opbevares på køl.

Hvordan sker der bagefter?

Analyse af testen tager ca 1 uge. Medmindre andet er aftalt, vil du herefter modtage svar fra klinikken i løbet af de næste par hverdage.

Hovedbudskab

Ingen nødvendige forberedelser hvis du ikke er behandlet med syredæmpende medicin eller antibiotika.

Prøven kan tidligst tages:

- 4 uger efter endt antibiotikakur
- 2 uger efter endt behandling med syredæmpende medicin

Indsaml afføringen uanset udseende og konsistens

Sørg for at sende prøven snarest fra posthus eller egen læge